



CHAMPAGNE ARDENNE

Bulletin N° 252 du 7/09/94

d'après les observations du 6/09/94

BETTERAVE

Maladies

Quelques foyers d'oïdium sont encore bien visibles dans certaines cultures (Sompuis, Vanault le Chatel, St Memmie). De nombreuses parcelles sont touchées par la cercosporiose mais les symptômes restent localisés sur quelques pieds.

La rouille et la ramulariose restent discrètes.

Les conditions climatiques sont toujours très favorables à l'installation des maladies foliaires.

■ *En conséquence, le renouvellement d'un fongicide est à prévoir pour les arrachages tardifs (récolte prévue en octobre) et dont le dernier fongicide polyvalent date de fin juillet. Il est conseillé, dans ce cas, d'utiliser un produit polyvalent et rémanent.*

Jaunisse

On trouve une grande majorité de champs quasi-indemnes. Cependant quelques parcelles sont fortement touchées avec de très nombreux foyers. La forte pression de jaunisse cette année a été bien jugulée par le traitement de semences.

COLZA

Stade levée à 3 feuilles.

Limaces

La vigilance s'impose du fait des conditions climatiques. Estimer l'importance de ce ravageur grâce à la pose de pièges (quelques appâts sous une tuile, une planche, voire un carton ondulé) permettant de dénombrer les cadavres.

■ *Intervenir dans tous les cas dès les premiers dégâts jusqu'au stade «2-3 feuilles». Produits utilisables :*

- bensultap à 5 % : MALICE à 7,5 Kg/ha,
- mercaptodiméthur à 4 % : MESUROL à 3 Kg/ha,
- métaldéhyde à 5 % : nombreuses spécialités de 5 à 10 Kg/ha,
- thiodicarbe à 4 % : SKIPPER à 5 Kg/ha.

Altises

Des piqûres d'altises sont observées sur feuillage, principalement en Haute-Marne.

Fréquence de pieds touchés

Lieu	Stade	% pieds
10Virey/Bar	2F	48
Merey/Arce	1F	12
Ville/Arce	levée	0
Magnant	2-3F	16
Arrentières	cotyl.	4
51Cernon	cotyl.	0
Humbeauvillé	cotyl.	0
Vitry en Perthois	cotyl.	0
Sept Saulx	cotyl.	0
St Hilaire le Grd	cotyl.	0
52Essey les Ponts	2F	48
Chateauvillain	1F	32
Chaumont	3F	16
Juzencourt	3F	20

■ *Dès la levée des colzas, penser à remettre les cuvettes jaunes en les enterrant légèrement.*

Toutes les parcelles précoces ayant atteint le stade 2 feuilles ne nécessitent plus de traitement. Maintenir la surveillance sur les levées plus tardives.

Rappel du seuil de traitement :

3 pieds sur 10 avec morsures jusqu'au stade 2 feuilles. Après ce stade, 20 à 30 captures cumulées dans le bac jaune.

Tenthrede de la rave

La présence de quelques adultes a été notée dans l'Aube (vallée de l'Arce). C'est une mouche dont les larves de couleur noire dévorent les feuilles au stade jeune du colza. Les attaques peuvent être confondues avec celles d'altises ou de limaces.

■ *Bien observer les cultures pour identifier ce ravageur, peu présent dans notre région habituellement.*

Pucerons

Le vol de pucerons verts n'a pas commencé à la tour de Lavannes. Cependant, les tout premiers ailés ont été observés sur parcelles précoces de Haute-Marne.

Maladies

Mildiou : quelques symptômes sur cotylédons sont observés localement dans quelques secteurs : Essey les Ponts (52), Magnant (10) et Ste Menéhould (51).

Phoma : les plantes sont sensibles aux attaques de la levée au stade 2-3 feuilles.

■ *Aucun fongicide n'est efficace sur ces 2 champignons à l'heure actuelle.*

En Bref...

■ **BETTERAVE :** oïdium et cercosporiose dominants. Quelques foyers de jaunisse.

■ **COLZA :** dégâts d'altises. Attention aux limaces.

P77